

France

>> Santé publique

>> L'AUTEUR

Michel JEANNEY

Secrétaire général de rédaction de La Dépêche Vétérinaire

Les Ardennes, l'un des départements les plus touchés par **la leptospirose humaine**

Les Ardennes présentent un des taux d'incidence annuelle de leptospirose humaine les plus élevés de France métropolitaine, confirme une enquête publiée, ce mois, par l'Institut de veille sanitaire.

Entre 1996 et 2005, le taux dans ce département oscille ainsi entre 1,7 et 7,9 pour 100 000 habitants. Il « *reste notablement et systématiquement supérieur* » au taux d'incidence moyen national (entre 0,4 et 0,7). En 2005, un taux d'incidence de 4,8 place même les Ardennes au premier rang en France.

« *Cette forte incidence s'explique par la présence conjuguée des facteurs de risques habituels de cette maladie, associée à sa recherche active* et à l'exhaustivité du recensement des cas par le Centre national de référence* », précisent les auteurs de l'enquête.

Ruralité, loisirs aquatiques, climat, hydrographie et rongeurs sont autant de facteurs de risque présents dans le département mis en évidence par l'enquête.

Populations de ragondins et de rats musqués en hausse

Les Ardennes se situent en effet parmi les 29 départements présentant la plus forte proportion de personnes habitant dans les communes de moins de 2 000 habitants. Elles présentent, en outre, un pourcentage d'agriculteurs plus élevé que la moyenne nationale. Or les personnes résidant à la campagne ont un risque plus grand de leptospirose et l'activité d'agriculteur est classée à haut risque.

Autre facteur, avec un réseau hydrographique dense, les activités de loisirs en eau douce y sont développées et continuent à progresser. De plus, le climat doux et humide, tel qu'il existe à la saison estivo-automnale, favorise la survie des leptospires dans l'environnement.

Enfin, les données animales semblent montrer un accroissement de la population des ragondins et des rats musqués, tous deux vecteurs de la leptospirose.

« *Les informations collectées ne permettent cependant pas de caractériser le risque représenté par la faune sur la population ardennaise* », soulignent les auteurs. « *Tout d'abord, aucune donnée n'est disponible sur la prévalence de la leptospirose chez les ragondins ou les rats musqués du département. D'autre part, le lien entre le portage de la faune et la contamination n'a jamais été précisément quantifié.* » ■

>> Encore plus d'infos !

Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Institut de veille sanitaire, 6 mai 2008, n° 19.

* Cette recherche de la leptospirose est souvent associée dans les Ardennes à celle de l'infection à Hantavirus dont les symptômes sont les mêmes.



Kelly Ann - Fotolia.com

La pratique d'activités de loisirs en eau douce est développée et progresse dans les Ardennes.