

Animaux de compagnie

Actualités chirurgicales

&gt;&gt; Urgence

&gt;&gt; L'AUTEUR


Guillaume CHANOIT

North Carolina State University

College of Veterinary Medicine

Raleigh, NC 27606, USA

Courriel : guillaume\_chanoit@ncsu.edu



## Hémopéritoine non traumatique : pensez hémangiosarcome

**La cause principale d'hémopéritoine non traumatique chez le chien est l'hémangiosarcome. Une récente étude montre qu'il s'agit en majorité d'hémangiosarcomes spléniques.**

Les hémopéritoinies sont un motif de consultation fréquent en urgence vétérinaire. La plupart du temps, aucun commémoratif de traumatisme n'est associé à cette pathologie. Les auteurs de cette étude\* ont revu 60 cas d'hémopéritoine non traumatique chez le chien et confirment que, dans une forte majorité, la cause de l'hémopéritoine est un cancer connu pour sa capacité à provoquer des saignements spontanés, à savoir l'hémangiosarcome (plus de 60 % au total de tous les diagnostics).

Parmi ces hémangiosarcomes, près des trois quarts étaient des hémangiosarcomes spléniques contre 15 % au niveau du foie et 5 % au niveau du rein.

### Age moyen de 9 ans

L'âge moyen des chiens atteints d'hémangiosarcomes était 9 ans. En ce qui concerne les autres causes, un peu plus d'un quart des cas étaient dus à un hématome splénique, 5 % à

une torsion splénique, 3 % à un carcinome hépatique et 1,6 % des cas à une carcinomatose péritonéale.

Comme l'on pouvait s'y attendre, les causes bénignes (torsion ou hématome spléniques) ont un meilleur pronostic puisque la quasi-totalité des chiens atteints de ces pathologies ont pu être rendus à leur propriétaire contre seulement un peu plus de 60 % des chiens atteints d'hémangiosarcomes.

### Envisager l'échographie abdominale

**A retenir :** la cause principale d'hémopéritoine non traumatique chez le chien est l'hémangiosarcome (splénique la plupart du temps). Il faut tout de même se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une règle systématique et qu'une échographie abdominale complète doit être envisagée dans tous les cas pour chercher d'autres sources éventuelles de saignement ou la présence de métastases.

Il faut aussi se rappeler qu'au niveau de la rate, hémangiosarcome et hématome sont extrêmement difficiles à distinguer sur la seule base de l'examen macroscopique. ■

\*Aronsohn, M.G., et al., Prognosis for acute nontraumatic hemoperitoneum in the dog: a retrospective analysis of 60 cases (2003-2006). J Am Anim Hosp Assoc, 2009, 45(2) : p. 72-7.

Hémangiosarcome splénique rupturé : vue intra-opératoire. L'hémangiosarcome splénique est la cause principale d'hémopéritoine non traumatique.

