

Animaux de compagnie

Actualités dermatologiques

>> Allergie

>> L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.E-mail : bordeauwilliam@yahoo.frSite web : <http://www.dermavet.com>

Les signes cliniques de la dermatite atopique canine

Le diagnostic de la dermatite atopique canine est uniquement clinique. Différentes lésions peuvent être observées, allant d'un érythème à l'apparition de papules, pustules, croûtes ou de lésions plus sévères comme une furonculose. Les examens complémentaires, comme les tests cutanés, ne servent qu'à déterminer les sensibilisations allergéniques du chien.

La dermatite atopique constitue l'une des principales dermatites allergiques chez le chien. Dans cet article*, les auteurs font le point sur ses signes cliniques ainsi que sur son diagnostic différentiel et sur les complications infectieuses qu'elle peut entraîner. Pour nos collègues anglo-saxons, la dermatite atopique ne comprend que la dermatite atopique due aux aéroallergènes ; c'est donc d'elle dont il est question dans cet article.

Cette dermatite allergique apparaît plus communément entre six mois et trois ans, bien qu'elle puisse apparaître chez des chiots dès deux mois d'âge. Il est ainsi rapporté qu'environ 3 % des chiens atopiques ont développé leurs premières lésions entre deux et trois mois. Inversement, il est rare de voir apparaître une dermatite atopique chez un chien âgé de plus de sept ans.

Nombreuses races prédisposées

Il existe de très nombreuses prédispositions raciales qui varient selon la population et le pays dans lequel l'étude a été effectuée. Cela comprend notamment le cocker, le boxer, le bull-terrier, le labrador. La dermatite atopique affecte préférentiellement certaines localisations comme la face interne des oreilles, les pieds et les lèvres. Différentes lésions peuvent y être observées, allant

d'un simple érythème à l'apparition de papules, pustules, croûtes ou de lésions plus sévères comme une furonculose.

Concernant les complications infectieuses, il faut prendre en considération la possibilité de survenue d'une pyodermite ou d'une dermatite à *Malassezia*. Elles vont alors être à l'origine de l'apparition d'un érythème qui peut être très sévère, d'une alopecie, d'une hyperpigmentation, d'une séborrhée grasse et d'un épaissement cutané. Ces complications infectieuses peuvent être à l'origine d'une importante exacerbation du prurit atopique. De ce fait, il faut toujours les rechercher, notamment lors de l'absence de réponse au traitement anti-allergique instauré.

Un vaste diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est vaste et comprend d'autres dermatites allergiques comme l'allergie alimentaire, la dermatite par allergie aux piqûres de puces ou certaines dermatoses parasitaires comme la gale sarcoptique ou la cheylétiellose.

À retenir : la dermatite atopique canine est fréquemment diagnostiquée en dermatologie vétérinaire. Tout animal présentant un érythème auriculaire et podal n'est toutefois pas nécessairement un chien atopique et il faut prendre en considération le diagnostic différentiel de cette dermatite allergique. On se rappellera par ailleurs que le diagnostic de la dermatite atopique est uniquement clinique et que les examens complémentaires, comme les tests cutanés, ne servent qu'à déterminer les sensibilisations allergéniques du chien. ■

*Griffin C (2008) Atopic disease, clinical signs and the diagnostic challenge. *J Small Anim Dermatol for Pract* Vol1: 8-14.



William Bordeaux

Shar-pei atopique.