

Animaux de compagnie

Actualités dermatologiques

>> Cas clinique

>> L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.

E-mail : bordeauwilliam@yahoo.fr

Site web : <http://www.dermavet.com>

Une alopecie paranéoplasique féline due à un adénocarcinome pancréatique

Vingt et un cas d'alopecie paranéoplasique pancréatique féline ont été décrits dans la littérature. Cette dermatose de mauvais pronostic se manifeste par une alopecie essentiellement ventrale à laquelle peut être associé un aspect brillant de la peau, relativement pathognomonique.

Si les dermatoses paranéoplasiques sont nombreuses chez l'Homme, il n'en est rien chez le chien et encore moins chez le chat. Dans cette dernière espèce, on connaît l'alopecie paranéoplasique due à un carcinome pancréatique, biliaire ou hépatique, la dermatose exfoliative due à un thymome et la dermatite nécrolytique superficielle due à un adénocarcinome pancréatique. Dans cet article*, les auteurs décrivent un cas d'alopecie paranéoplasique d'origine pancréatique.

La chatte européenne, âgée de 12 ans, est présentée en consultation du fait de l'apparition d'une anorexie et d'une diarrhée depuis quelques jours. À l'examen clinique, elle apparaît déshydratée et léthargique. La température corporelle est normale. Les tests FeLV et FIV sont négatifs. Une analyse hématologique est effectuée, qui révèle une leucocytose, une neutrophilie, une lymphopénie et une thrombopénie modérée. L'analyse biochimique révèle peu d'anomalies.

Coussinets mous et douloureux

La chatte est alors hospitalisée, mise sous perfusion et sous antibiotiques. Après quelques jours, et parce qu'elle remange, la chatte est rendue à son propriétaire. Quelques jours après, elle est représentée en consultation du fait d'une profonde dépression et de l'apparition d'une dermatose. Elle se manifeste par une alopecie localisée au niveau des lèvres, du planum nasal, de la face médiale des membres antérieurs et de l'abdomen. Les poils s'épilent facilement. Au niveau des membres, la peau apparaît très brillante. Aucun prurit n'est signalé par le propriétaire. Les coussinets sont mous et douloureux à la palpation.

«L'alopecie est localisée aux lèvres, au planum nasal, à la face médiale des membres antérieurs et de l'abdomen. Les poils s'épilent facilement.»

Du fait de la suspicion de démodécie, différents raclages sont réalisés, qui ne permettent pas de mettre en évidence ce parasite. La cytologie cutanée ne permet pas d'observer de levures du genre *Malassezia*. Aucun ectoparasite n'est récupéré à l'occasion du brossage du pelage de l'animal.

L'autopsie confirme le diagnostic

Après réalisation de ces examens, les auteurs ont une très forte suspicion d'alopecie paranéoplasique pancréatique féline. Étant donné le mauvais pronostic de cette dermatose et du mauvais état général de la chatte, les propriétaires décident de son euthanasie. L'autopsie révèle l'existence d'une masse pancréatique, ainsi que de plus petites masses au niveau du foie et du péritoine. L'analyse histologique de la masse pancréatique confirmera qu'il s'agissait d'un adénocarcinome. L'analyse histologique des prélèvements cutanés était tout à fait en faveur d'une alopecie paranéoplasique pancréatique féline.

À retenir : l'alopecie paranéoplasique pancréatique féline est une dermatose rare (21 descriptions dans la littérature), de mauvais pronostic, qui se manifeste par une alopecie essentiellement ventrale à laquelle peut être associé un aspect particulièrement brillant de la peau, relativement pathognomonique. ■

* Florizoone K (2008) A case of feline paraneoplastic alopecia associated with a pancreatic adenocarcinoma. *Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift* Vol. 77: 23-25.



Alopecie paranéoplasique pancréatique féline.