

## Animaux de compagnie

## Actualités dermatologiques

## &gt;&gt; Cas clinique

## &gt;&gt; L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,  
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.E-mail : [bordeauwilliam@yahoo.fr](mailto:bordeauwilliam@yahoo.fr)Site web : <http://www.dermavet.com>

## Un cas de lupus érythémateux discoïde atypique chez un spitz

**Le lupus érythémateux discoïde se manifeste classiquement par une atteinte faciale, plus particulièrement de la truffe, du chanfrein et des paupières. Il existe aussi des localisations atypiques. Le cas d'une chienne spitz montre que toute lésion dorsolombaire ne doit pas systématiquement être attribuée à une dermatite par allergie aux piqûres de puces.**

Le lupus érythémateux discoïde représente l'une des principales dermatoses auto-immunes chez le chien. Toutes les races peuvent être affectées, même si on le rencontre plus particulièrement chez le colley et le Shetland. A la différence du lupus érythémateux systémique, il n'entraîne aucune atteinte des organes internes.

Les lésions initiales se localisent généralement au niveau de la truffe et du chanfrein. Il est également possible d'observer des lésions au niveau des pavillons auriculaires et de la gueule. Plus rarement, les lésions se localisent en région ano-génitale. Cette dermatose auto-immune est photo-aggravée. Dans cet article\*, les auteurs décrivent un cas atypique avec une atteinte dorsolombaire.

### Les biopsies permettent le diagnostic

La chienne, de race spitz et âgée de 3 ans, est référée aux auteurs du fait de l'absence de réponse au traitement antifongique d'une dermatose apparue 6 mois auparavant, s'étant initialement manifestée par un érythème et un squamosis dorsolombaires sans prurit associé, et pouvant donc être attribuée à une dermatophytose. L'examen clinique ne révèle que l'existence de ces lésions dorsolombaires. Il n'y a notamment aucune atteinte faciale, ni symptômes généraux. Différents examens

complémentaires comme des raclages sont réalisés, qui ne mettent pas en évidence de parasites. Les analyses biochimiques, hématologique et urinaire ne révèlent aucune anomalie. Il est alors décidé de réaliser de multiples biopsies cutanées afin d'en effectuer une analyse histologique et différents immunomarquages.

Cela a permis de conclure à l'existence d'un lupus érythémateux discoïde.

### Corticoïde, shampoing émoullissant et antibiotique

Un traitement corticoïde à la dose de 1 mg/kg par voie orale, en 2 prises journalières, est mis en place, associé à la réalisation d'un shampoing antiseptique régulier et à l'application d'un émoullissant. La chienne reçoit aussi un traitement antibiotique. Progressivement, les lésions cutanées ont commencé à régresser pour finalement disparaître après 6 semaines de traitement. Les lésions ne sont pas réapparues dans les 5 mois qui ont suivi mais les auteurs ne précisent pas si les traitements ont été interrompus ou espacés.

**A retenir :** bien que le lupus érythémateux discoïde se manifeste classiquement par une atteinte faciale, plus particulièrement au niveau de la truffe, du chanfrein et des paupières, il existe des localisations plus atypiques telles que la région dorsolombaire comme c'est le cas chez cette chienne. Réciproquement, cela montre une fois de plus que toute lésion dorsolombaire ne doit pas systématiquement être attribuée à une dermatite par allergie aux piqûres de puces. ■

\*Goo MJ & coll. (2008) Discoid Lupus Erythematosus (DLE) in a Spitz Dog. *J. Vet. Med. Sci.* 70(6): 633-635.



Lupus cutané nasal chez un cocker.

William Bordeaux