

Animaux de compagnie

Actualités dermatologiques

>> Diagnostic

>> L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.E-mail : bordeauwilliam@yahoo.frSite web : <http://www.dermavet.com>

Dermatite miliaire féline : identifier la cause pour la contrôler

Le diagnostic de la dermatite miliaire féline implique celui de sa cause sous-jacente. Elle n'est pas uniquement due à une dermatite par allergie aux piqûres de puces, même s'il s'agit de sa première cause.

La dermatite miliaire féline se manifeste par l'apparition de papules et de fines crotelles plus ou moins importantes et plus communément observées en région dorsolombaire et à l'encolure*. Le terme miliaire vient du latin *miliaris* qui signifie millet, car ces lésions donnent l'impression qu'on a saupoudré l'animal de grains de millet. Il n'existe aucune prédisposition liée à l'âge, à la race ou au sexe.

La dermatite miliaire peut avoir de très nombreuses origines, la plus commune étant la dermatite par allergie aux piqûres de puces. En dehors de cette étiologie, il faut également envisager l'existence d'une allergie alimentaire, d'une dermatite atopique, d'une dermatose parasitaire (trombiculose, otacarirose, phtiriose, cheylétiellose), d'une dermatophytose ou d'un pemphigus foliacé.

Rechercher les lésions et leur localisation

Afin d'en déterminer l'origine, on recherchera l'existence d'autres lésions et leurs localisations plus ou moins caractéristiques. Par exemple, le pemphigus foliacé est également à l'origine de lésions croûteuses localisées préférentiellement aux conques auriculaires, à la face ou au planum nasal. Les ectoparasites et les dermatophytes sont recherchés par les examens complémentaires adéquats. Les puces et leurs excréments sont recherchés après examen minutieux du pelage, suivi d'un peignage.

Les raclages cutanés permettent de récupérer des larves d'aoûtats, des otodectes ou des cheylétielles. Le trichogramme permet d'observer des œufs de cheylétielles ou de poux. Les dermatophytes sont recherchés après examen complet de l'animal à l'aide d'une lampe de Wood, suivi de la réalisation d'un trichogramme, voire d'une culture mycologique.

Un diagnostic difficile

Le diagnostic de certitude d'une dermatite par allergie aux piqûres de puces est difficile, alors qu'il est facile d'en avoir une suspicion. Les biopsies cutanées ne présentent généralement pas d'intérêt, tout au plus lorsqu'on a une suspicion de certaines dermatoses comme le pemphigus foliacé. Il peut être nécessaire de réaliser un régime d'élimination en surveillant que le suivi est bien respecté, ce qui est parfois difficile chez un chat qui sort.

Il n'existe aucun traitement spécifique et la résolution et l'absence de rémission passent avant tout par l'identification de la cause sous-jacente et son contrôle.

À retenir : la dermatite miliaire est régulièrement observée chez le chat. Il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic en soi mais uniquement de l'une des manifestations de nombreuses dermatoses, qu'elles soient allergique, parasitaire ou auto-immune. Dans ce cadre, on se rappellera que la dermatite miliaire féline n'est pas uniquement due à une dermatite par allergie aux piqûres de puces même s'il s'agit de sa première cause.

* Coatesworth J (2007) *Feline miliary dermatitis*. UK Vet Vol. 12: 73-76.