

Animaux de compagnie

Actualités dermatologiques

>> Diagnostic

>> L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.E-mail : bordeauwilliam@yahoo.frSite web : <http://www.dermavet.com>

La dermatite de léchage canine n'est pas toujours liée à un trouble comportemental

Les dermatites de léchage frappent surtout les chiens de grand format. Les mâles sont plus touchés que les femelles. Une étude dresse le bilan des connaissances sur cette affection, qui peut avoir de nombreuses origines et n'est pas toujours liée à un trouble comportemental.

La dermatite de léchage canine est une dermatose fréquente, multifactorielle, qui peut être un véritable challenge à traiter. Dans cet article*, les auteurs font le point sur les connaissances à ce sujet.

Cette affection est plutôt décrite dans de grandes races, du doberman au rottweiler, en passant par le labrador. Les mâles semblent affectés deux fois plus que les femelles ; dans la majorité des cas, les lésions apparaissent avant trois ans.

Les lésions observées résultent de l'action de léchage du chien. Dans un premier temps, on observe une alopecie diffuse, essentiellement localisée au niveau des carpes et des métatarses, de 2 à 6 cm de diamètre. Puis progressivement, la peau se pigmente, s'épaissit, des nodules peuvent apparaître.

De plus en plus souvent chez les chiens atopiques

Avec la chronicité, des complications infectieuses plus ou moins sévères surviennent.

Contrairement à l'idée habituellement véhiculée, toutes les dermatites de léchage ne sont pas d'origine comportementale. Il convient ainsi d'écarter toutes les causes dermatologiques, orthopédiques ou neurologiques. Concernant les causes dermatologiques, on écartera notamment certaines dermatoses parasitaires comme la démodicose ou la gale sarcoptique et certaines néoplasies cutanées comme le mastocytome. On constate de plus en plus souvent l'existence de dermatites de léchage chez des chiens atopiques.

Le traitement peut être très long

Concernant les causes ostéo-articulaires, on écartera notamment les dermatites de léchage occasionnées par une arthrite ou une ostéomyélite. Finalement, on se rappellera qu'une douleur chronique peut être également une origine possible. Une fois toutes ces causes écartées, on pourra s'orienter vers une origine comportementale.

Le traitement de la dermatite de léchage passe par l'identification et le contrôle de la cause sous-jacente. Le traitement peut être très long, surtout lors de lésions chroniques. Le traitement de la dermatite de léchage d'origine comportementale, qui représente près de 50 % de l'ensemble des dermatites de léchage canines, est réalisé par la mise en place de mesures cognitives et l'utilisation de divers psychotropes.

Gérer les complications infectieuses

Quelle qu'en soit la cause, on n'oubliera pas de gérer les complications infectieuses qui sont fréquentes. On privilégiera les traitements antibiotiques systémiques dans la mesure où, du fait du léchage, le chien élimine tous les topiques qui pourraient être appliqués sur le site.

À retenir : les dermatites de léchage à localisation carpienne et métatarsienne ont de très nombreuses origines et toutes ne sont pas liées à un trouble comportemental. Une rémission peut être difficile à obtenir. Elle passe par l'identification et le contrôle de la cause sous-jacente et la gestion des complications infectieuses. ■

* Paterson S, Midgley D, Barclay I (2007) Canine acral lick dermatitis. In practice Vol: 29: 328-332.



Dermatite de léchage chez un labrador.