

Animaux de compagnie

Actualités dermatologiques

>> Diagnostic

>> L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.

E-mail : bordeauwilliam@yahoo.fr

Site web : <http://www.dermavet.com>



Dermatite pyotraumatique canine : identifier la cause sous-jacente

La dermatite pyotraumatique, manifestation commune de nombreuses dermatoses du chien, n'est pas toujours due à une allergie aux piqûres de puces. Il faut rechercher toutes les causes possibles avant de mettre en place un traitement pour obtenir la résolution complète des lésions et l'absence de récurrences.

La dermatite pyotraumatique, anciennement appelée *hot spot*, est une pyodermite de surface (selon la classification employée par l'auteur), d'apparition rapide, assez bien délimitée, alopecique et exsudative. Elle concerne plus particulièrement la région dorsolombaire, les membres, l'encolure et la région périoculaire. Les chiens qui présentent un pelage dense, comme le golden retriever, le berger allemand ou le saint-Bernard, sont prédisposés mais la dermatite pyotraumatique peut survenir chez des chiens au pelage plus court comme le rottweiler. Un prurit intense est généralement décrit et il s'agit bien souvent de lésions douloureuses.

Des examens complémentaires sont nécessaires

Il est important de se rappeler que la dermatite pyotraumatique n'est pas un diagnostic final en soi. En effet, elle résulte de très nombreuses dermatoses sous-jacentes : dues à des parasites externes comme les puces, les cheyletielles ou les sarcoptes, à des allergies comme la dermatite par allergie aux piqûres de puces ou la dermatite atopique, ou de troubles de la kératinisation comme l'adénite sébacée, ou encore d'une dysendocrinie comme l'hypothyroïdie.

L'identification et le contrôle de la cause sous-jacente sont les garants d'une résolution complète des lésions et de l'absence de récurrences, dans la même localisation ou non. Il est donc important de réaliser des examens complémentaires adéquats, comme les raclages cutanés et le trichogramme. Il est par ailleurs extrêmement important de différencier une dermatite pyotraumatique d'une folliculite/furonculose pyotraumatique par l'aspect clinique et la cytologie cutanée car le traitement en est différent.

Tondre la zone affectée

Le traitement d'une dermatite pyotraumatique passe avant tout par la tonte de la zone affectée qui doit, si besoin, être réalisée sous tranquillisation. Un shampoing antiseptique est ensuite réalisé régulièrement, puis un glucocorticoïde topique ou systémique est employé, plus ou moins associé à un antibiotique.

À retenir : la dermatite pyotraumatique est une manifestation commune de nombreuses dermatoses observées chez le chien. Elle n'est pas toujours due à une dermatite par allergie aux piqûres de puces comme on le pense communément. Il faut donc rechercher toutes les causes possibles avant de mettre en place un traitement. ■

* Curtis C (2007) Canine pyotraumatic dermatitis. UK Vet Vol.12 : 63-67.