

Animaux de compagnie

Actualités dermatologiques

>> Infectiologie

>> L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.E-mail : bordeauwilliam@yahoo.frSite web : <http://www.dermavet.com>

Otites externes canines : rechercher les facteurs prédisposants

Pour contrôler efficacement une otite externe et prévenir les récurrences, il faut non seulement éliminer les agents infectieux en cause mais surtout déterminer le ou les facteur(s) déclenchant(s) et rechercher les facteurs favorisants.

L'otite externe est un motif fréquent de consultation chez le chien. Elle résulte de facteurs déclenchants mais aussi perpétuants. Dans bon nombre de cas, il existe également un facteur prédisposant qui doit être systématiquement recherché.

Il existe de très nombreux facteurs prédisposants qui, comme leur nom l'indique, favorisent l'apparition d'une otite mais sans généralement suffire à l'entraîner*. Il peut s'agir d'un problème de conformation, notamment l'existence d'une hypertrichose auriculaire, d'une oreille tombante ou d'une sténose congénitale du conduit auditif comme c'est parfois le cas chez le shar-pei.

Il peut également s'agir d'une humidité excessive qui survient lors de baignades fréquentes ou de shampooings trop réguliers.

Le nettoyage auriculaire parfois en cause

Aussi surprenant que cela puisse être, le nettoyage auriculaire peut être également un facteur favorisant l'apparition d'une otite externe. En effet, il peut être trop fréquent, trop agressif ou réalisé avec un produit trop irritant.

Il existe ensuite une pléthore de facteurs déclenchants qui sont les véritables causes primaires de l'apparition de l'otite externe. Toutefois, dans la majorité des cas, l'otite externe a une cause allergique, qu'il s'agisse d'une dermatite atopique due à des aéroallergènes ou une allergie alimentaire, ou parasitaire, avec

présence d'*Otodectes* notamment. Il peut également s'agir d'un corps étranger, notamment un épillet.

Les dysendocrinies peu impliquées

On compte ensuite des causes beaucoup plus rares, comme les troubles de la kératinisation, notamment une séborrhée primaire idiopathique, ou une dermatose améliorée par la vitamine A, des dermatoses auto-immunes comme le pemphigus foliacé ou les lupus, ou encore la cellulite juvénile. Contrairement à l'idée habituellement répandue, les dysendocrinies comme l'hypothyroïdie ou le syndrome de Cushing sont rarement à l'origine d'une otite externe.

Différents éléments peuvent être à l'origine de la perpétuation de l'otite externe : agents infectieux, modifications de la conformation auriculaire ou otite moyenne.

Souvent des staphylocoques et des *Malassezia*

Parmi les agents infectieux, il s'agit souvent de staphylocoques lors d'otites aiguës tandis que lors d'otites chroniques, on isole plus fréquemment une espèce appartenant au genre *Pseudomonas*. Les levures du genre *Malassezia* sont également souvent à l'origine de la perpétuation d'une otite externe.

À retenir : le contrôle, mais aussi l'absence de récurrence, d'une otite externe passe certes par l'élimination des agents infectieux en cause mais aussi et surtout par la détermination du ou des facteurs déclenchants. La recherche d'un facteur favorisant doit être systématiquement réalisée. ■

* Craig M (2008) Disease facts : Otitis externa. UK Vet Vol. 13: 63-64.



Otite à *Pseudomonas* chez un cocker.

William Bordeaux