

Animaux de compagnie

Actualités dermatologiques

>> Prurit

>> L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.E-mail : bordeauwilliam@yahoo.frSite web : <http://www.dermavet.com>

Dermatite atopique canine : une étude a recherché **des éléments prédictifs**

Dermatose fréquente dans l'espèce canine, la dermatite atopique a fait l'objet d'une étude cherchant à identifier des éléments permettant de la prédire chez un chien. Il apparaît que les chiens atopiques développent des troubles cutanés plus précocement que les autres.

La dermatite atopique constitue l'une des principales dermatoses dans l'espèce canine. Selon les études, on considère qu'il s'agit de la première ou de la seconde cause de prurit dans cette espèce. Certaines races sont prédisposées, comme le labrador et le golden retriever, le setter, le West Highland white terrier et le bull terrier.

Un handicap pour le chien et son propriétaire

Le diagnostic de cette dermatite allergique est exclusivement clinique et les tests cutanés ont uniquement un intérêt thérapeutique, à savoir la mise en place d'une désensibilisation chez des chiens allergiques aux aéroallergènes. Si chez certains animaux elle se contrôle parfaitement et peut être guérie, chez d'autres, elle peut être véritablement handicapante.

C'est pourquoi, dans cette étude*, les auteurs ont recherché les différents éléments permettant de prédire si des chiens guides d'aveugles appartenant aux races labrador et golden retriever allaient, ou non, devenir atopiques. En effet, la dermatite atopique, si elle peut être handicapante pour l'animal, peut l'être également pour la personne non ou malvoyante.

Cette étude rétrospective a été réalisée chez 30 chiens, dont la moitié était atopique. Au moment de l'étude, ces animaux étaient âgés

de 2 à 11 ans. Chez tous, les auteurs ont systématiquement relevé l'existence ou non de problèmes cutanés, l'âge d'apparition de ceux-ci, ainsi que le type de manifestation. Ils ont également recherché si certaines dermatoses survenaient plus communément ou moins fréquemment chez les chiens atopiques.

Problèmes cutanés avant 7 mois

Ils ont ainsi constaté que 9 des 15 chiens atopiques avaient déjà eu des problèmes cutanés avant l'âge de 7 mois, contre 3 des 15 chiens qui n'étaient pas atopiques. Tous les chiens atopiques ont eu au moins un problème cutané, d'origine atopique ou non, avant l'âge de 11 mois et des symptômes cutanés d'origine atopique avant l'âge de 15 mois. Par contre, ce n'est qu'à l'âge de 22 mois que les chiens qui n'étaient pas atopiques ont tous eu au moins un problème cutané. Statistiquement, à l'âge de 10 mois, plus de chiens atopiques ont développé leurs premiers symptômes cutanés que les chiens qui n'allaient pas devenir atopique. Ce sont les seuls éléments prédictifs qui ont pu être déterminés.

À retenir : la dermatite atopique constitue l'une des dermatoses les plus fréquentes dans l'espèce canine. Même si l'on ne dispose pas actuellement d'éléments permettant de prédire à 100 % si un chien va devenir atopique ou non, cette étude montre que les chiens atopiques développent des troubles cutanés plus précoces, du moins chez les retrievers, races chez lesquelles cette étude a été réalisée. **W.B.**

*Fraser MA, McNeil PE, Girling SJ (2008) Prediction of future development canine atopic dermatitis based on examination of clinical history. *J Small Anim Pract* 49: 128-132.