

## Animaux de compagnie

## Actualités dermatologiques

## &gt;&gt; Thérapeutique

## &gt;&gt; L'AUTEUR

William BORDEAU

Consultant exclusif en dermatologie

Clinique vétérinaire - 3, avenue Foch,  
94700 Maisons-Alfort - Tél. : 06.64.54.24.68.E-mail : [bordeauwilliam@yahoo.fr](mailto:bordeauwilliam@yahoo.fr)Site web : <http://www.dermavet.com>

## Gérer les complications infectieuses chez le chien atopique

**Le praticien doit savoir gérer les complications infectieuses liées à des bactéries ou des levures rencontrées chez le chien atopique. Le diagnostic s'appuie sur leur connaissance clinique et surtout sur la réalisation d'une cytologie cutanée. Le traitement anti-infectieux doit allier efficacité et tolérance.**

Chez le chien atopique, le prurit et les lésions résultent de la dermatite allergique mais aussi des complications infectieuses qu'elle peut occasionner. C'est pourquoi il est important qu'elles soient diagnostiquées afin de les contrôler et ainsi entraîner une rémission complète. Dans cet article\*, les auteurs font le point à la fois sur le diagnostic de ces complications infectieuses et sur les traitements qui doivent être mis en place.

Le diagnostic des complications infectieuses passe notamment par la réalisation d'une cytologie cutanée. Elle demande peu de matériel et est simple et rapide à réaliser. Il existe différentes techniques de prélèvement, la plus courante étant la technique par impression directe.

### Prélever au coton-tige ou au ruban adhésif

Sur certaines localisations comme les espaces interdigités cela peut être difficile à réaliser ; c'est pourquoi on préférera réaliser le prélèvement avec un coton-tige ou du ruban adhésif.

Une fois le matériel prélevé, il faut en effectuer une coloration rapide de type Diff Quick. Pour terminer, la lame est rincée à l'eau claire et séchée avant d'en effectuer une lecture microscopique. Dans un premier temps, on effectue une lecture avec les objectifs 4 et 10 afin de déterminer la meilleure zone à analyser puis on passe à l'objectif à immersion.

**«Lors de mise en évidence de bacilles, il faut impérativement s'appuyer sur les résultats de l'antibiogramme.»**

La gestion des complications infectieuses passe par l'utilisation de traitements topiques et/ou systémiques.

### Choisir la galénique en fonction des lésions

Concernant les topiques, on choisira la forme galénique en fonction de l'extension des lésions notamment. On réservera les gels, crèmes et solutions aux complications infectieuses localisées et les shampoings aux formes étendues. Le traitement systémique doit impérativement être choisi en fonction des agents infectieux observés sur la cytologie, et non uniquement sur l'aspect lésionnel.

Lors de l'observation de coques, on peut généralement s'orienter vers une antibiothérapie de première intention, notamment à base de céphalosporine, tandis que lors de mise en évidence de bacilles, il faut impérativement s'appuyer sur les résultats de l'antibiogramme.

### Ne pas sous-doser l'antibiotique

Le traitement antibiotique doit être suffisamment long et il ne faut jamais faire de sous-dosage sous peine d'entraîner l'apparition d'une résistance bactérienne.

**A retenir :** les complications infectieuses, qu'elles soient liées à des bactéries ou des levures, sont fréquemment rencontrées chez le chien atopique. Leur diagnostic repose sur leur connaissance clinique mais aussi et surtout sur la réalisation d'une cytologie cutanée. Du diagnostic de ces complications découle la mise en place d'un traitement anti-infectieux ciblé qui doit allier efficacité et tolérance. **W.B.**

\*Frieberg C (2008) Treatment of secondary infections in patients with atopic dermatitis. *J Small Anim Dermatol for Pract Vol. 1: 20-25.*