

Animaux de compagnie

>> Synthèse

L'AUTEUR

Nicolas FAUCHIER

Affections des griffes du chien : rares et de causes variées

L'atteinte des griffes est une manifestation relativement rare lors d'affection générale ou de dermatose chez le chien. Il faut rechercher une éventuelle existence de lésions sur d'autres parties du corps et une asymétrie de l'atteinte des griffes afin de faciliter le diagnostic de l'affection en cause.

Les affections des griffes sont relativement rares chez le chien puisqu'elles représentent moins de 5 % des motifs de consultation en pratique générale. Étonnamment, malgré leur rareté, elles ont de nombreuses causes, très variées. Ces affections sont souvent douloureuses, ce qui motive le propriétaire à consulter rapidement afin d'obtenir un résultat tout aussi rapide. Dans cet article*, l'auteur fait un point complet sur toutes les dermatoses pouvant être à l'origine d'une atteinte des griffes chez le chien.

Il existe très peu de dermatoses affectant exclusivement ou quasi exclusivement les griffes. Généralement, cette atteinte fait partie d'un cortège lésionnel et il est donc important de rechercher des lésions se trouvant sur d'autres parties du corps. De même, cette atteinte peut être symétrique ou non, ce qui est important dans le diagnostic étiologique.

Un vaste diagnostic différentiel

Ainsi, lors d'atteinte asymétrique, on envisage plutôt un traumatisme, une origine infectieuse ou néoplasique, tandis que lors d'atteinte symétrique, on s'oriente plutôt vers une origine métabolique, auto-immune, nutritionnelle ou génétique.

Concernant les affections à l'origine d'une atteinte exclusive ou quasi exclusive des griffes chez le chien, il faut essentiellement envisager une paronychie bactérienne, une onychomycose, une onychodystrophie lupoïde symétrique et un épithélioma spinocellulaire. La paronychie bactérienne se manifeste par un érythème et un gonflement du doigt, elle est généralement très douloureuse, notamment du fait de la suppuration qui est souvent présente. L'onychodystrophie lupoïde symétrique est assez commune et se traduit dans un premier temps par une déformation de la griffe, généralement suivie de sa chute. Le diagnostic est histologique et requiert l'exérèse de la griffe mais aussi de la troisième phalange.

Origine auto-immune, métabolique, endocrine...

Concernant les affections étant notamment à l'origine d'une atteinte des griffes, il faut essentiellement envisager une dermatose auto-immune, et plus particulièrement un pemphigus foliacé, mais aussi une dysendocrinie comme un syndrome de Cushing, voire une hypothyroïdie, une maladie métabolique comme une dermatite nécrolytique superficielle ou une dermatose répondant à l'administration de zinc.

À retenir : l'atteinte des griffes est une manifestation relativement rare lors d'affection générale ou de dermatose chez le chien. Le diagnostic différentiel est vaste et il faut donc rechercher une éventuelle existence de lésions sur d'autres parties du corps et une asymétrie de cette atteinte des griffes afin d'en faciliter le diagnostic. ■

*Neuber A (2009) Nail diseases in dogs. UK Vet Vol. 14: 56-61.



Onychodystrophie lupoïde symétrique.

William BORDEAU