

Grippe AH1N1 mise au point

Dans l'attente d'une vaccination spécifique (non encore possible) et dont les modalités ne sont pas fixées, même si la progression épidémique reste faible en France métropolitaine, il est indispensable de mettre en place des mesures sanitaires dans les cliniques et cabinets vétérinaires urbains et ruraux.

1- avant l'apparition de l'épidémie – c'est-à-dire dès maintenant

- des mesures de prévention hygiéniques renforcées pour tous les professionnels vétérinaires ou non (ASV, stagiaires, personnel d'entretien, ...) :
 - ↳ s'équiper de poubelles à fermeture non manuelle et s'assurer de leur désinfection quotidienne après élimination des sacs
 - ↳ équiper les bureaux, salles d'accueil, sanitaires, salles de pause ou de restauration de solution ou gel hydroalcooliques, outre l'eau et le savon (non partageable avec les autres !)
 - ↳ donner au personnel d'entretien des instructions renforcées : nettoyage et désinfection soigneux de tout ce qui peut être touché : poignées de portes et fenêtres, banques d'accueil, etc...
- formation et instructions
 - ↳ éviter les contacts : bises du matin..., poignées de main... à remplacer par salut verbal
 - ↳ se laver les mains plusieurs fois par jour, les sécher avec une serviette à usage unique à jeter dans la poubelle fermée
 - ↳ en cas de toux ou d'éternuements, utiliser un mouchoir à usage unique, l'éliminer dans la poubelle et se laver les mains après.

2- si l'épidémie est avérée (on le saura par les médias, l'INVeS, les groupes médicaux de surveillance)

- ↳ port des masques FFP2 (possibilités de rupture de stocks) pour tous les professionnels. Bien les placer sur le visage. Port maximum 4 à 5 heures. Non réutilisables. Elimination dans poubelle fermée.
- ↳ Pour les malades revenant au travail, port des masques chirurgicaux 8 à 10 jours car contagion possible.

3- ne pas oublier d'ajouter à votre « document unique » le risque de grippe A et les mesures prises.

4- Evaluer dans le personnel les cas :

- femmes enceintes
- asthmatiques lourds
- cardiopathiques
- diabétiques
- immuno déprimés
-

pour déterminer les candidats à la vaccination.

Le 04 septembre 2009-09-05

Dr Henri MARTINEZ